


35614.970 35614.Z  
RA 0111 OS P4 (ref 4.1)

**Мерсилон®**



## ИНСТРУКЦИЯ

(информация для потребителей)  
по медицинскому применению препарата

### Мерсилон®

**Регистрационный номер:** П №011971/01 от 23.06.2006

**Торговое название:**  
Мерсилон®

**Лекарственная форма:**  
таблетки

#### Состав препарата:

**Активные вещества:** дезогестрел 0,15 мг, этинилэстрадиол 0,02 мг.  
**Вспомогательные вещества:** крахмал картофельный, повидон, стеариновая кислота, кремния оксид коллоидный безводный, α-токоферол, лактозы моногидрат.

#### Описание:

*Круглые двояковыпуклые таблетки белого цвета, диаметром около 6 мм, с надписью "ORGANON" на одной стороне таблетки и TR над цифрой 4 на другой стороне таблетки.*

#### Фармакотерапевтическая группа:

контрацептивное средство (эстроген + прогестаген)

#### Код АТХ: G03AA09

#### Фармакологические свойства:

Мерсилон является комбинированным пероральным контрацептивом ("комбинированные таблетки"). Каждая таблетка содержит небольшое количество двух разных женских половых гормонов. Это дезогестрел (прогестаген) и этинилэстрадиол (эстроген). Из-за небольшого количества гормонов Мерсилон считается низкодозированным пероральным контрацептивом. Поскольку все таблетки в упаковке содержат одни и те же гормоны в одной и той же дозе, он считается монофазным комбинированным пероральным контрацептивом. Комбинированные пероральные контрацептивы также могут оказывать благоприятное неконтрацептивное воздействие. Менструации могут стать короче и менее обильными. В результате снижается риск развития анемии. Боли во время менструации могут ослабевать или совсем исчезнуть. Кроме того, сообщалось о том, что некоторые серьезные заболевания встречаются реже у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, содержащие 50 мкг этинилэстрадиола ("высокودозированные таблетки"). Это доброкачественные заболевания молочной железы, кисты яичника, воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), внематочная беременность (беременность, при которой эмбрион имплантируется вне матки) и рак эндометрия (слизистой оболочки матки) и яичников. Это также может относиться и к низкодозированным противозачаточным таблеткам, но пока это подтверждено только в отношении рака яичника и эндометрия.

#### Показания к применению:

Мерсилон используется для предупреждения беременности.

Пероральные контрацептивы являются высокоэффективным методом контрацепции. При правильном приеме (без пропуска в приеме таблеток) вероятность забеременеть очень низка.

#### Противопоказания:

Не используйте противозачаточные таблетки, если у Вас имеется какое-либо из перечисленных ниже состояний. Если какое-либо из этих состояний имеет к Вам отношение, сообщите об этом своему доктору прежде, чем использовать Мерсилон . Ваш доктор может посоветовать использовать другой тип противозачаточных таблеток или другой (негормональный) метод контрацепции.

- Если у Вас есть или когда-либо были нарушения кровообращения, особенно состояния, связанные с тромбозом (образование сгустков крови) нижних конечностей (тромбоз глубоких вен), легких (легочная эмболия), сердца (инфаркт миокарда) или других частей тела (см. ниже в разделе "Мерсилон и тромбоз").
- Если у Вас есть или был инсульт (нарушение мозгового кровообращения).
- Если есть или когда-либо было состояние, которое может быть первым признаком инфаркта миокарда (например, стенокардия или боль в груди) или инсульта (например, преходящая ишемическая атака или преходящее нарушение мозгового кровообращения).
- Если у Вас бывают мигрени, сопровождающиеся нарушением зрения, нарушением речи, слабостью или онемением любой части тела.
- Если у Вас тяжелая форма артериальной гипертензии с артериальным давлением  $\geq 160/100$ .
- Если Вы страдаете сахарным диабетом с поражением сосудов.
- Если у Вас был или есть панкреатит (воспаление поджелудочной железы), сопровождающийся высоким уровнем липидов в крови.
- Если у Вас есть признаки желтухи (пожелтение кожи) или тяжелой заболевания печени.
- Если у Вас был или есть рак молочной железы или половых органов.
- Если у Вас была или есть доброкачественная или злокачественная опухоль печени.
- Если у Вас вагинальное кровотечение неясной этиологии.
- Если Вы беременны или думаете, что можете быть беременны.
- Если Вы выкуриваете более 15 сигарет в день и Вы старше 35 лет.
- Если у Вас аллергия на этинилэстрадиол, или дезогестрел, или на любой другой компонент, входящий в состав Мерсилона .

bs-35614-V4b (TE) 293 15-08-2006 16:22

Tekeningnr.: 12.158/12.502 Formaat: 273 x 433,5 mm

- PMS 254
- Black
- DIE-CUT > no printing

Если любое из этих состояний появляется впервые в процессе приема таблеток, сразу прекратите их прием и проконсультируйтесь с доктором. В это время используйте негормональные противозачаточные средства.

#### С осторожностью

*Прежде, чем Вы начнете принимать Мерсилон* Если комбинированные таблетки используются при одном из перечисленных ниже состояний, Вам может потребоваться постоянное наблюдение врача. Поэтому если одно из этих состояний относится к Вам, скажите об этом доктору до начала приема Мерсилона.

- Вы курите;
- У Вас диабет;
- У Вас избыточная масса тела;
- У Вас повышенное артериальное давление;
- У Вас заболевание клапанов сердца или нарушения ритма сердца;
- У Вас воспаление вен (поверхностный флебит);
- У Вас варикозное расширение вен;
- У кого-либо из ближайших родственников был тромбоз, инфаркт миокарда или инсульт;
- Вы страдаете мигренью;
- Вы страдаете эпилепсией;
- У Вас или у кого-либо из Ваших ближайших родственников повышен или был повышен уровень холестерина или триглицеридов (жировых веществ) в крови;
- У кого-либо из Ваших ближайших родственников был рак молочной железы;
- У Вас заболевание печени или желчного пузыря;
- У Вас болезнь Крона или язвенный колит (хроническое воспалительное заболевание кишечника);
- У Вас системная красная волчанка;
- У Вас гемолитическо-уремический синдром (нарушение свертывания крови, вызывающее почечную недостаточность);
- У Вас серповидно-клеточная анемия;
- У Вас есть или была хлоазма (желто-коричневые участки пигментации кожи, преимущественно на лице); если да, то следует избегать длительного воздействия солнечного света или ультрафиолетового излучения.

Если любое из перечисленных выше состояний возникло впервые, повторяется или ухудшается в процессе использования таблеток, Вы должны обратиться к врачу

#### Применение в период беременности и грудного вскармливания

**Противозачаточные таблетки и беременность** Мерсилон не должны использоваться беременные женщины, или женщины, которые думают, что они могут быть беременными. В случае если Вы подозреваете, что беременны, в то время как Вы принимаете Мерсилон, обратитесь к доктору как можно быстрее.

#### Противозачаточные таблетки и грудное вскармливание

Мерсилон не рекомендуется использовать при грудном вскармливании.

#### Способ применения и дозы.

Упаковка Мерсилона содержит 21 таблетку. На упаковке напротив каждой таблетки указан день недели, в который ее следует принимать. Принимать таблетки нужно по одной каждый день примерно в одно и то же время, при необходимости запивая небольшим количеством воды, следуя указаниям стрелки, до тех пор, пока не кончится упаковка. В течение следующих 7 дней Вы не принимаете таблеток. Во время этих 7 дней должна начаться менструация (кровотечение отмены). Обычно она начинается на 2–3 день после приема последней таблетки Мерсилона. Начинайте принимать таблетки из следующей упаковки на 8-ой день, даже если менструация еще продолжается. Это значит, что Вы всегда будете начинать новую упаковку в один и тот же день недели, и менструация у Вас будет начинаться примерно в одни и те же дни каждый месяц.

#### Начало приема первой упаковки Мерсилона

*Гормональные контрацептивы в предшествующий период (последний месяц) не использовались.* Начните прием таблеток с 1-го дня вашего менструального цикла, то есть с первого дня менструации. Возьмите из упаковки таблетку, помеченную соответствующим днем недели. Например, если менструация началась в пятницу, примите таблетку, напротив которой указано – "пятница". Затем следуйте по дням недели по порядку. Контрацептивный эффект будет сразу, поэтому не нужно применять дополнительные методы контрацепции. Можно начать прием и со 2–5 дня цикла. В таком случае в течение первого цикла рекомендуется дополнительно использовать барьерный метод контрацепции на протяжении первых 7 дней приема таблеток.

#### Переход от другого комбинированного перорального контрацептива (КОК)

Вы можете начать прием Мерсилона на следующий день после приема последней таблетки предыдущего КОК (это значит, что между приемами таблеток нет перерыва). Если в упаковке Вашего предыдущего контрацептива есть неактивные таблетки, Вы можете начать принимать Мерсилон на следующий день после приема последней активной таблетки (если Вы не уверены, какая из них активная, спросите у врача или фармацевта). Вы можете начать и в более поздний срок, но ни в коем случае не позднее следующего дня после окончания 7-дневного перерыва в приеме таблеток из используемой упаковки (или в день после приема последней неактивной таблетки из используемой упаковки). Если Вы будете следовать приведенным инструкциям, Вам не обязательно использовать дополнительные методы контрацепции.

#### Переход с препарата, содержащего только прогестаген ('мини-пилли')

Вы можете прекратить использование 'мини-пилли' в любой день и начать прием Мерсилона на следующий день в то же время. В этом случае советуют дополнительно использовать барьерный метод в течение первых 7 дней приема таблеток, если у Вас будут половые контакты.

*При переходе на Мерсилон после инъекции, или импланта, или прогестаген-содержащей ВМС.* Начинайте принимать Мерсилон в день, когда должна быть следующая инъекция, или в день удаления импланта. Если у Вас будут половые контакты, то для полной уверенности используйте дополнительные противозачаточные средства (барьерный метод) в первые 7 дней приема таблеток.

#### После родов

Если у Вас недавно родился ребенок, врач может посоветовать Вам дождаться первой нормальной менструации перед началом приема Мерсилона. Иногда, по рекомендации врача, прием можно начать раньше. Если Вы кормите грудью и хотите принимать Мерсилон, посоветуйтесь сначала с врачом.

#### После выкидыша или аборта

Посоветуйтесь с врачом.

#### Если Вы приняли слишком много таблеток Мерсилона (передозировка)

О серьезных опасных последствиях приема слишком большого количества таблеток Мерсилона ничего не сообщалось. Если Вы сразу приняли несколько таблеток за раз, у Вас может появиться тошнота, рвота или вагинальное кровотечение. Если Вы обнаружили, что ребенок проглотил таблетку Мерсилона, обратитесь к врачу.

#### Если Вы хотите прекратить прием Мерсилона

Вы можете перестать принимать Мерсилон в любое время, когда захотите. Если Вы прекращаете прием Мерсилона, потому что хотите забеременеть, обычно рекомендуется дождаться первой нормальной менструации, прежде чем пытаться зачать ребенка. Это поможет Вам спрогнозировать срок рождения ребенка. Если Вы не хотите беременеть, проконсультируйтесь с врачом о других методах контрацепции.

#### Что делать, если...

- Если Вы опоздали с приемом таблетки *менее чем на 12 часов*, контрацептивная защита не снижается. В этом случае следует принять таблетку сразу, как Вы вспомните об этом, и принимать следующие таблетки в обычное время.
- Если Вы опоздали с приемом таблетки *более чем на 12 часов*, контрацептивная защита может быть снижена. Чем больше таблеток подряд Вы пропустили, тем выше риск, что их противозачаточное действие ослабится. Особенно высок риск наступления беременности, если Вы пропустили первые или последние таблетки из упаковки. В этом случае Вы должны следовать приведенным ниже правилам приема (см. также диаграмму ниже).

#### Забyli принять больше одной таблетки из упаковки

Посоветуйтесь с врачом.

#### Пропущена 1 таблетка в первую неделю

Примите пропущенную таблетку сразу, как только Вы об этом вспомните (даже если Вам придется принять две таблетки сразу). Следующие таблетки принимайте в обычное время. Используйте дополнительные противозачаточные средства (барьерный метод) в следующие 7 дней. Если Вы имели половой контакт в течение недели, предшествовавшей пропуску таблетки, есть вероятность наступления беременности. Поэтому немедленно сообщите об этом врачу.

#### Пропущена 1 таблетка во вторую неделю

Примите пропущенную таблетку сразу, как только Вы об этом вспомните (даже если Вам придется принять две таблетки сразу). Следующие таблетки принимайте в обычное время. Эффективность таблеток сохраняется. Вам не нужно использовать дополнительные противозачаточные средства.

#### Пропущена 1 таблетка в третью неделю

Вы можете выбрать один из следующих методов, не прибегая к дополнительным противозачаточным методам:

- примите пропущенную таблетку сразу, как только Вы об этом вспомните (даже если Вам придется принять две таблетки сразу). Следующие таблетки принимайте в обычное время. Начните следующую упаковку сразу после окончания используемой, то есть *без перерыва*. У Вас может отсутствовать менструальноподобное кровотечение до окончания приема таблеток второй пачки, но могут быть межменструальное кровотечение или мажущие выделения в дни приема таблеток.

Или

- прекратите прием таблеток из используемой упаковки, сделайте 7-дневный или меньший перерыв (считая также день, когда Вы пропустили прием таблетки), начните следующую упаковку. Следуя этому методу, Вы можете начать следующую упаковку в тот же самый день недели, в какой Вы делаете это обычно.

Если Вы забывали принимать таблетки, и у Вас нет ожидаемой менструации в первый нормальный перерыв в приеме таблеток, то, возможно, Вы беременны. Посоветуйтесь с врачом, прежде чем начинать следующую упаковку.

#### Что делать, если....

*... У Вас желудочно-кишечные расстройства (например, рвота, сильная диарея)* Если у Вас рвота или сильная диарея, это значит, что активные ингредиенты могли всосаться неполностью. Если у Вас рвота была через 3–4 часа после приема таблетки Мерсилона, это равносильно пропуску таблетки. Поэтому следуйте указаниям относительно пропуска таблеток. Если у Вас сильная диарея, проконсультируйтесь с врачом.

#### ... Вы хотите задержать начало менструации

Вы можете задержать начало менструации, если начнете следующую упаковку Мерсилона сразу же после окончания предыдущей. Вы можете продолжать прием таблеток из этой упаковки до тех пор, пока они не кончатся. Когда Вы захотите, чтобы началась менструация, просто прекратите прием таблеток. Во время использования второй упаковки у Вас могут появиться межменструальное кровотечение или мажущие выделения в дни приема таблеток. Начните следующую упаковку после 7-дневного перерыва в приеме таблеток.

#### ... Вы хотите изменить день начала менструации

Если Вы принимаете таблетки в соответствии с указаниями, у Вас начинается менструация примерно в один и тот же день каждые 4 недели. Если Вы хотите изменить день начала менструации, просто сократите

(никогда не удлинняйте) очередной перерыв в приеме таблеток. Например, если у Вас менструация начинается обычно в пятницу, а в будущем Вы хотите, чтобы она началась во вторник (на 3 дня раньше), то Вы должны начать новую упаковку на 3 дня раньше, чем обычно. Если Вы сделаете перерыв в приеме таблеток очень коротким (например, 3 дня или меньше), то у Вас может не быть кровянистых выделений во время перерыва. У Вас могут быть межменструальное кровотечение или мажущие выделения во время использования следующей упаковки.

**... У Вас появилось неожиданное кровотечение**  
 При приеме любых ОК в течение первых нескольких месяцев у Вас могут быть нерегулярные вагинальные кровотечения (межменструальное кровотечение или мажущие выделения) между менструациями. Возможно, Вам придется пользоваться гигиеническими прокладками, но прием таблеток нужно продолжать, как обычно. Нерегулярные вагинальные кровотечения обычно прекращаются после того, как Ваш организм приспособился к Мерсилону (обычно через 3 цикла приема таблеток). Если они продолжают, становятся сильнее или начинаются снова, обратитесь к врачу.

**... если у Вас нет менструации**  
 Если Вы принимали все таблетки своевременно, и у Вас не было рвоты, и Вы не пользовались другими лекарствами, тогда маловероятно, что вы беременны. Продолжайте прием Мерсилона как обычно. Если у Вас два раза подряд не было менструации, Вы можете быть беременны. Не начинайте новую упаковку Мерсилона, пока Ваш лечащий врач не проверит, не беременны ли Вы.

#### Побочное действие

Как при приеме любого лекарственного средства, прием Мерсилона может сопровождаться некоторыми побочными эффектами. Скажите своему лечащему врачу, если Вы заметили какие-либо нежелательные эффекты, особенно сильные или длительные, или если в Вашем самочувствии произошли изменения, которые, по Вашему мнению, могут быть связаны с приемом таблеток.

#### Серьезные побочные эффекты

**Противозачаточные таблетки и тромбоз**  
 Тромбоз – это образование кровяного сгустка, который может заблокировать кровеносный сосуд. Иногда тромбоз возникает в глубоких венах нижних конечностей (тромбоз глубоких вен). Если кровяной сгусток отрывается от стенок вены, где он образовался, он может достичь и заблокировать легочные артерии и вызвать так называемую 'легочную эмболию'. Тромбоз глубоких вен – редкое явление. Он может развиться независимо от того, принимает женщина таблетки или не принимает. Риск возникновения тромбоза у женщин, принимающих таблетки, выше, чем у тех, кто их не принимает. Риск возникновения тромбоза у женщин, принимающих таблетки, выше в самом начале приема таблеток. Тромбоз также может возникнуть во время беременности.

Риск заболевания тромбоза глубоких вен у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, содержащие дезогестрел, может быть немного выше, чем у женщин, принимающих таблетки, содержащие левоноргестрел. Абсолютные числа остаются не такими значительными. Например, из 10 000 женщин, принимающих в течение года противозачаточные таблетки, в состав которых входит левоноргестрел, у 2 женщин может возникнуть тромбоз. А, например, из 10 000 женщин, принимающих в течение года таблетки, содержащие дезогестрел, - приблизительно у 3–4 женщин. Для сравнения: из 10 000 беременных женщин приблизительно у 6 может возникнуть тромбоз. Приведенные результаты основываются на данных исследований. Результаты других исследований показывают, что противозачаточные таблетки, содержащие дезогестрел, не повышают риск заболевания тромбозом.

Кровяной сгусток очень редко может образоваться также в сосудах сердца (вызывая инфаркт) или мозга (вызывая инсульт).

Крайне редко кровяной сгусток может образоваться в сосудах печени, кишечника, почки и глаза.

В очень редких случаях тромбоз может привести к серьезному долговременному нарушению трудоспособности или даже летальному исходу. Риск развития инфаркта или инсульта возрастает с возрастом. *Он также увеличивается тем больше, чем больше Вы курите. Принимая противозачаточные таблетки, Вам следует отказаться от курения, особенно, если Вы старше 35 лет.*

Если у Вас повышается артериальное давление во время приема таблеток, Вам могут посоветовать немедленно

прекратить их использование.

Риск развития тромбоза глубоких вен временно возрастает в результате операции или иммобилизации (например, если ваша нога или ноги находятся в гипсе или шине). У женщин, принимающих таблетки, риск может быть еще выше. Заранее сообщите доктору о том, что Вы принимаете таблетки, если Вам предстоит госпитализация или операция. Врач может посоветовать прекратить прием таблеток за несколько недель до операции или на время иммобилизации. Он также скажет, когда Вы можете возобновить прием таблеток после того, как встанете на ноги.

Если Вы заметили возможные признаки тромбоза, прекратите прием таблеток и посоветуйтесь немедленно с врачом.

#### Противозачаточные таблетки и рак

Рак молочной железы диагностировался несколько чаще у женщин, которые принимали таблетки, чем у женщин того же возраста, которые их не принимали. Это незначительное увеличение постепенно исчезает в течение 10 лет после прекращения приема таблеток. Неизвестно, вызвано ли это различие приемом таблеток. Возможно, что женщины, принимающие таблетки, обследуются чаще, что приводит к более раннему выявлению рака молочной железы. Сообщалось о редких случаях доброкачественных опухолей печени у женщин, принимающих таблетки. Эти опухоли могут приводить к внутреннему кровотечению. Обратитесь к доктору немедленно при сильной боли в животе.

Сообщалось, что рак шейки матки чаще встречается у женщин, принимающих противозачаточные таблетки в течение длительного времени. Эти данные могут быть не связаны с таблетками, но могут быть связаны с сексуальным поведением и другими факторами.

#### Другие возможные побочные эффекты

Нерегулярные кровянистые выделения (мажущие или обильные) могут быть при использовании любого КОК, особенно в первые месяцы приема. Сообщалось о следующих побочных эффектах у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, которые не обязательно вызваны таблетками. Эти побочные эффекты могут возникать в первые месяцы использования таблеток и обычно уменьшаются со временем.

- Болезненность и нагрубание молочных желез, боль и появление секреции;
- Головная боль, мигрень;
- Изменение полового влечения, депрессивное настроение/изменение настроения;
- Непереносимость контактных линз;
- Тошнота, рвота, жалобы на боль в животе;
- Изменение вагинальной секреции;
- Различные кожные реакции;
- Задержка жидкости;
- Изменение массы тела;
- Повышение артериального давления;
- Реакции гиперчувствительности.

Если Вы заметили другие побочные эффекты, которые не перечислены в списке выше, проинформируйте о них своего лечащего врача.

#### Передозировка

Нет сообщений о серьезных неблагоприятных последствиях одновременного приема слишком большого числа таблеток Мерсилона. Если Вы сразу приняли несколько таблеток, то у Вас могут возникнуть тошнота, рвота или вагинальное кровотечение. Если Вы обнаружили, что ребенок проглотил таблетки Мерсилона, обратитесь к врачу.

#### Взаимодействие с другими препаратами и другие формы взаимодействия

Некоторые лекарственные препараты могут снижать контрацептивный эффект противозачаточных таблеток. К ним относятся препараты, используемые для лечения эпилепсии (например, примидон, фенитоин, барбитураты, карбамазепин, окскарбазепин, топирамат, фелбамат); туберкулеза (например, рифампицин, рифабутин) и ВИЧ-инфекций (например, ритонавир); и антибиотики (например, пенициллин, тетрациклины, гризеофульвин), принимаемые для лечения некоторых других инфекционных болезней; лекарственные средства из зверобоя (исключительно использовались для лечения депрессии). Противозачаточные таблетки могут тоже повлиять на действие других лекарственных средств. Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту о том, какие другие лекарственные средства, в том числе растительные, Вы принимаете или принимали (даже те, которые Вы принимаете без рецепта). Также сообщите другому врачу, который назначает Вам другие лекарства (или выдающему лекарство фармацевту), что Вы

используете Мерсилон. Они могут сказать Вам, нужно ли Вам применять дополнительные противозачаточные средства и если да, то как долго.

#### Особые указания

*Что Вам нужно знать до начала приема Мерсилона?*

##### Основные замечания

В этой инструкции описано несколько ситуаций, при которых следует прекратить прием таблеток или при которых надежность таблеток может быть снижена. В таких ситуациях Вы должны воздержаться от половых контактов или должны использовать дополнительные негормональные противозачаточные средства, например, презервативы или другие барьерные методы. Не используйте календарный или температурный методы. Эти методы могут быть неэффективны, так как таблетки влияют на те обычные изменения температуры и цервикальной слизи, которые имеют место в течение менструального цикла.

**Мерсилон, как и все противозачаточные таблетки, не защищает от ВИЧ инфекций и (СПИДА) или других заболеваний, передаваемых половым путем.**

**Когда Вам следует обратиться к доктору?**

##### Регулярный осмотр

Если Вы принимаете противозачаточные таблетки, Вам необходимо проходить регулярные осмотры каждый год.

#### Обращайтесь к врачу немедленно, если:

- Вы заметили какие-либо изменения в состоянии Вашего здоровья, особенно когда это касается вопросов, затронутых в этой инструкции (см. разделы 'Противопоказания' и 'С осторожностью'; не забывайте о пунктах, касающихся ближайших родственников);
- Вы чувствуете тяжесть в груди;
- Вы собираетесь принимать другие лекарства (см. также раздел 'Мерсилон и другие лекарственные препараты');
- Вы должны провести некоторое время в неподвижном состоянии или Вам предстоит операция (проконсультируйтесь с врачом, по крайней мере, за четыре недели до этого);
- У Вас необычно сильное вагинальное кровотечение;
- Вы забыли принять таблетки в первую неделю упаковки и у Вас был половой контакт в предыдущие семь дней;
- У Вас сильная диарея;
- У Вас не было менструаций два раза подряд или Вы подозреваете, что беременны (не начинайте следующую упаковку, пока не посоветуетесь с врачом).

**Прекратите прием таблеток и немедленно обратитесь к врачу, если Вы заметили возможные признаки тромбоза:**

- Необычный кашель;
  - Сильная боль в груди, которая может отдавать в левую руку;
  - Одышка;
  - Необычная, сильная или длительная головная боль или приступ мигрени;
  - Частичная или полная потеря зрения, или двоение в глазах;
  - Нарушение речи или потеря речи;
  - Внезапное изменение слуха, обоняния или вкуса;
  - Головокружение или обморок;
  - Слабость или потеря чувствительности какой-либо части тела;
  - Сильная боль в животе;
  - Сильная боль или отечность одной из ног.
- Перечисленные выше ситуации и симптомы более подробно описаны и объяснены в других разделах настоящей инструкции.

#### Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами

Влияние препарата Мерсилон на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не отмечено.

#### Форма выпуска.

По 21 таблетке в блистере из поливинилхлоридной пленки и алюминиевой фольги. Каждый блистер упакован в герметично запаянный саше из ламинированной алюминиевой фольги. По 1, 3 или 6 саше вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

#### Условия хранения.

При температуре 2–30 °С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. Список Б.

#### Срок годности

3 года

Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

#### Условия отпуска из аптек.

По рецепту.

#### Производитель.

*Н. В. Органон (Нидерланды)*  
 Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss  
 5349 AB Осс, Клоостерштраат 6

*Представительство в России.*  
 125445, Москва, ул. Смольная, 24 Д  
 'Меридиан', Органон Эйдженсиз Б.В.  
 Телефон (495)960 2897. Факс (495) 960 2896

